

Lepinox Plus

Βρέξιμη σκόνη (WP)

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής, Στόχος, Δόσεις σκευάσματος, Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Γκρέπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Κιτριά): Ανθοτρήτης, 25 γρ/στρέμμα, Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προεidoποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συνιστάται ένας ψεκασμός στην αρχή της ανθοφορίας και δεύτερος, εάν χρειασθεί, μετά από 7-10 ημέρες.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΦΥΤΙΚΙΑ: Φυλλοδέτες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές, 25 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προεidoποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό με τη χρήση φερομονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ: Φυλλοδέτες, 25 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προεidoποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό με τη χρήση φερομονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μήλιά, Αχλαδιά (εκτός από τις ποικιλίες «Κρυστάλλι» και «Κουντούλα»), Κυδωνιά: Φυλλοδέτες, Άλλες προνύμφες λεπιδοπτέρων, 75-150 γρ/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH >80).

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά: Καρτόκαφα, Ανάρσια, Φυλλοδέτης, 75-150 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH >80).

ΑΜΠΕΛΙ (οινοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια): Κογκυλίδα, Ευδεμίδα, 75-150 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH >80).

ΕΛΙΑ: Πυρηνοτρήτης (ανθόβια γενιά), 25 γρ/στρέμμα, Οι ψεκασμοί να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών γεωργικών προεidoποιήσεων. Εάν δεν υπάρχουν, να διενεργηθούν οι ακόλουθοι ψεκασμοί: Ψεκασμός όταν το 5-25% των ανθέων έχει ανοίξει. Ψεκάζουμε μόλις εμφανιστούν τα πρώτα ανοικτά άνθη. Επανάληψη εφαρμογής μετά 7-10 ημέρες, εάν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός εντόμων. Χρήση ήσσονος σημασίας: Μαργαρόνια*, 25 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων και μέχρι οι καρποί να είναι έτοιμοι για συγκομιδή. BBCH 11-89.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: Προνύμφες λεπιδοπτέρων, 75-150 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH >80).

ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ+Θ): Σποντόπετρα, 75-150 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων (BBCH >80).

ΣΟΛΑΝΟΔΗ (Υ+Θ): Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά: Σποντόπετρα, Φυλλορύκτης τομάτας (Tuta absoluta), 75-150 γρ/στρέμμα. Πράσινο σκουλήκι, Κάμπια λαχάνων, 100-150 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH >80).

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με μη βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα, **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ):** Κολοκυθάκι, Αγγούρι: Σποντόπετρα, Πράσινο σκουλήκι, 75-150 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH >80).

ΚΕΦΑΛΩΤΕΣ ΚΡΑΜΒΕΣ (Υ+Θ): Λάχανο, Λαχανάκια Βρυξελλών, **ΦΥΛΛΩΔΕΙΣ ΚΡΑΜΒΕΣ (Υ+Θ):** Κινέζικα λάχανα, **ΑΝΘΟΚΡΑΜΒΕΣ (Υ+Θ):** Μπρόκολο, Κουνουπίδι, **ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΑΩΝ) (Υ+Θ):** Γογγύλι: Πιερίδα λαχάνων, Σποντόπετρα, Πλουτέλλα, 75-150 γρ/στρέμμα, Μαμέστρα, 100-150 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εδωδιμου τμήματος (BBCH ≥ 40).

ΜΑΡΟΥΛΙΑ & ΣΑΛΑΤΙΚΑ (Υ+Θ): Μαρούλι, Ραδίκι, Αντιδι, Ραντίσιο, Εσκαράβ, Ρόκα, Λυκατρίβολο, **ΣΠΑΝΑΚΙ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ (Υ+Θ):** Σπανάκι, ΣέσκουλοΦύλλα τεύτλων, **ΛΑΧΑΝΙΚΑ με στέλεχος (Υ+Θ):** Άγρια αγκινάρα (ποικιλία cardoon), **ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΑ ΑΝΘΗ (Υ+Θ):** Σέλινο, Μάραθο, Μαϊντανός, Σχοινόπρασο, Βασιλικός: Σποντόπετρα, Πράσινο σκουλήκι, Προνύμφες λεπιδοπτέρων, 75-150 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συγκομιζόμενου τμήματος (BBCH ≥ 40).

ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Κάμπια αγκινάρας, 75-150 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση του φυλλώματος (BBCH ≥ 19).

ΜΠΑΜΙΑ (Υ+Θ): Προνύμφες φυλλώματος, 40-50 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση του φυλλώματος (BBCH ≥ 19).

ΠΡΑΖΟ (Υ+Θ): Προνύμφες φυλλώματος , 40-50 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση του φυλλώματος (BBCH ≥ 19).

ΦΑΣΟΛΙΑ (Υ+Θ) (με λοβό και χωρίς λοβό): Πράσινο σκουλήκι, 75-150 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH >80).

ΒΑΜΒΑΚΙ: Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, 30-50 γρ/στρέμμα, Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών ή σύμφωνα με τις γεωργικές προεidoποιήσεις.

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Πυραλίδα, Πράσινο σκουλήκι, Σεζάμια, 40-50 γρ/στρέμμα, Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών.

ΛΥΚΙΣΚΟΣ: Πυραλίδα, 75-150 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση του συγκομιζόμενου τμήματος (BBCH >80).

ΚΑΠΝΟΣ: Πράσινο σκουλήκι, 100-150 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση του συγκομιζόμενου φυλλώματος (BBCH >80).

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υ+Θ) & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ+Θ): Προνύμφες λεπιδοπτέρων 75-150 γρ/στρέμμα, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και τελευταία εφαρμογή κατά την ολοκλήρωση της ωρίμανσης των ανθέων (BBCH >80).

ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ: Πεύκο, Βελανιδιά: 25 γρ/στρέμμα. Φυλλοφάγες προνύμφες Πιτυοκάμπη: Ψεκασμός φυλλώματος τον Σεπτέμβριο. Λυμάντρια: Ψεκασμός φυλλώματος τον Απρίλιο/Μάιο. Υφάντριά, Μαλακόσσωμα: Ψεκασμός φυλλώματος τον Μάιο/Ιούνιο.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (litra/στρέμμα): ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 200-400, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΦΥΤΙΚΙΑ, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ: 150-250, ΜΗΛΟΕΙΔΗ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 60-150, ΑΜΠΕΛΙΑ: 10-150, ΕΛΙΑ: 150-300, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: 60-150, ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ+Θ): 50-150, ΣΟΛΑΝΟΔΗ (Υ+Θ): 50-150, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ+Θ) με μη βρώσιμο φλοιό & με βρώσιμο φλοιό: 60-150, ΚΕΦΑΛΩΤΕΣ ΚΡΑΜΒΕΣ (Υ+Θ), ΦΥΛΛΩΔΕΙΣ ΚΡΑΜΒΕΣ (Υ+Θ), ΑΝΘΟΚΡΑΜΒΕΣ (Υ+Θ), ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (εκτός ζαχαροτεύτλων) (Υ+Θ): 50-150, ΜΑΡΟΥΛΙΑ & ΣΑΛΑΤΙΚΑ (Υ+Θ), ΣΠΑΝΑΚΙ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ (Υ+Θ), ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (Υ+Θ), ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΑ ΑΝΘΗ: (Υ+Θ): 50-100, ΑΓΚΙΝΑΡΑ: 50-150, ΜΠΑΜΙΑ (Υ+Θ): 50-100, ΠΡΑΖΟ (Υ+Θ): 50-80, ΦΑΣΟΛΙΑ (Υ+Θ) με λοβό και χωρίς λοβό: 50-100, ΒΑΜΒΑΚΙ: 50-80, ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: 50-100, ΛΥΚΙΣΚΟΣ: 60-150, ΚΑΠΝΟΣ: 50-150, ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υ+Θ) & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ+Θ): 60-150, ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ: 300-500.

Μέγιστος φθινός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΦΥΤΙΚΙΑ, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημερές. ΜΗΛΟΕΙΔΗ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ+Θ), ΣΟΛΑΝΟΔΗ (Υ+Θ), ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ+Θ) με μη βρώσιμο φλοιό & με βρώσιμο φλοιό, ΚΕΦΑΛΩΤΕΣ ΚΡΑΜΒΕΣ (Υ+Θ), ΦΥΛΛΩΔΕΙΣ ΚΡΑΜΒΕΣ (Υ+Θ), ΑΝΘΟΚΡΑΜΒΕΣ (Υ+Θ), ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (εκτός ζαχαροτεύτλων) (Υ+Θ), ΜΑΡΟΥΛΙΑ & ΣΑΛΑΤΙΚΑ (Υ+Θ), ΣΠΑΝΑΚΙ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ (Υ+Θ), ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (Υ+Θ), ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΑ ΑΝΘΗ (Υ+Θ), ΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΜΠΑΜΙΑ (Υ+Θ), ΠΡΑΖΟ (Υ+Θ), ΦΑΣΟΛΙΑ (Υ+Θ) (με λοβό και χωρίς λοβό), ΒΑΜΒΑΚΙ, ΛΥΚΙΣΚΟΣ, ΚΑΠΝΟΣ, ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υ+Θ) & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ+Θ): 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημερές. ΕΛΙΑ: Για τον Πυρηνοτρήτη: 3 εφαρμογές με βάση τις γεωργικές προεidoποιήσεις ή τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά (βλ. τρόπο και χρόνο εφαρμογής). Για τη Μαργαρόνια*: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημερές. ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ: 3 εφαρμογές. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός. Χρησιμοποιήστε καλό λύσιμο όλες της φυλλώδεις επιφάνειες γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπούν το σκεύασμα. Μετά την κατάρτιση οι κάμπιες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε λίγες ημέρες.
- Μην ψεκάσετε εάν σημειωθεί βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά από ψεκασμό, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί.
- Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.
- Να μη χρησιμοποιείτε νερό για ψεκασμό με pH άνω του 8, αλλιώς να χρησιμοποιείτε παράγοντα αλσίωσης. Για διασφάλιση της διάκρισης δράσης συνιστάται η χρήση κατάλληλου προσκαλχητικού.
- Οι ψεκασμοί να διενεργούνται τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας.

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της μαργαρόνιας στην ελιά. Για την χρήση αυτή ο κάτοχος της ελιάς δεν είναι ευχάριστη πιθανή απώλεια που αφορά την αποπαραγωγικότητα από τη χρήση του.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 0 ημέρες για όλες τις καλλέργειες του φάσματος δράσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλλέργειας φυλλώματος με συμβατικούς ψεκαστές. Εδώ για την ευδεμίδα και την κογκυλίδα στο αμπέλι, συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται στη ζώνη των σταφυλιών.


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε λίγο νερό. Προσθέτουμε το πικνό διάλυμα στο μισομεγέθο με νερό ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε με νερό υπό συνεχή ανάδευση. Ψεκάζουμε με το ψεκαστικό υγρό μέσα σε λίγες ώρες. Σε περίπτωση ανάγκης με άλλο σκεύασμα διαλύουμε πρώτα το LEPINOX PLUS WP και μετά προσθέτουμε το άλλο σκεύασμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αφού με τη εφαρμογή δεκάστε τελείως τον ψεκαστικό. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυθίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κρύο απορρυπαντικό αραιωμένο όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει πρέπει να αραιώνεται με νερό και να ψεκάται στην περιοχή που έχει ήδη γίνει εφαρμογή. Τα κενά μέσα συσκευασίας (σφαιλίδες) ξεπλύνονται υπό πίεση με καθαρό εξοπλισμό ή γίνεται ημεδαύτως έκλυση (α νερό που ξεπλύνεται το θήκοο στο ψεκαστικό υγρό), καταστρέφεται μαζί με τα κομμά με σκόνη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης και ελαττώσεται όλο σε σημείο συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Lepinox® Plus

Καθ. Βάρος:
1kg



Κάτοχος της έγκρισης:
CBC (Europe) S.r.l.
via Zanica 25
24050 Grassobbio (BG), ITALY

BIOGARD®
biological First.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.
Κέκροπος 62 & Κονίτης 38, Μαρούσι,
151 25, Αθήνα, τηλ. 210-6460700

Lepinox Plus
ΛΕΠΙΝΟΞ ΠΛΑΣ
Βρέξιμη σκόνη (WP)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strain EG 2348 37,5% β/β ή 32.000 IU T.ni/mg
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100% β/β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα δια καταπόσεως των παραγομένων τοξινών (κρυσταλλικών πρωτεϊνών) του *Bacillus thuringiensis*, οι οποίες αφού διεισδύσουν στα αιμολεμφικά υγρά προσβάλλουν τις ακραίες κυτταρικές μεμβράνες προκαλώντας λύση κυττάρων και έτσι επιφέρουν το θάνατο των προνυμφών σε διάστημα λίγων ημερών.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΥΑΑΤ): 14.556/22-3-2016

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
•Μην αναπνέετε τα σταγονίδια του ψεκασμού.
•Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
•Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
•Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.
Περιέχει *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain EG 2348. Οι μικροοργανισμοί μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν αντιδράσεις ευαισθητοποίησης.
•Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:

Οι χειριστές συνιστάται να χρησιμοποιούν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατάλληλο για μικροβιακά σκευάσματα και γάντια, με σχετική σήμανση της Ε.Ε. και σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 κατά το χειρισμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός επιμένει. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε την περιοχή που έχει έλθει σε επαφή με το προϊόν με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση κατάποσης, δώστε στον πάσχοντα να πει 1-2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά προϊόντα όπως Βορδιγάλειος πολτός, πολυθειούχο ασβέστιο κλπ.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείται σε χώρο καλά αεριζόμενο, ξηρό και δροσερό. Σε θερμοκρασία δωματίου (20° C) το προϊόν παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Ξανακλείστε τη συσκευασία του σε περίπτωση μερικής χρήσης. Αποφεύγετε την έκθεσή του στο ηλιακό φως.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
HM/NIA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
HM/NIA ΛΗΞΗΣ:

Αναγράφονται πάνω στη συσκευασία



Rev.02-2024